

# Strumento RAF

Principi attivi e FPI<sup>1</sup> più comuni, e le loro RAF<sup>2</sup> più frequenti tra gli ospiti di case di cura sopra i 65 anni

**Principio attivo (esempio di preparato) e indicazione principale**

## Sistema nervoso

### Analgesici

Principio attivo (esempio di preparato) e indicazione principale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Diclofenac (Voltaren<sup>®</sup>)</b> Dolori					■	■		■		■			■	■	
<b>Fentanyl (Durogesic<sup>®</sup>)<sup>3</sup></b> Dolori	■	■			■			■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Ibuprofene (Brufen<sup>®</sup>)</b> Dolori, febbre							■						■		■
<b>Metamizole (Novalgin<sup>®</sup>)<sup>4</sup></b> Dolori, febbre															
<b>Paracetamolo (Dafalgan<sup>®</sup>)</b> Dolori, febbre															

### Psicofarmaci/sedativi

<b>Aloperidolo (Haldol<sup>®</sup>)<sup>3</sup></b> Schizofrenia, disturbi schizoaffettivi	■	■			■	■			■	■	■	■	■	■	■
<b>Idrossizina (Atarax<sup>®</sup>)<sup>4</sup></b> Stati di ansia, prurito										■				■	
<b>Lorazepam (Temesta<sup>®</sup>)<sup>4</sup></b> Disturbi del sonno, stati di ansia	■	■			■				■					■	
<b>Oxazepam (Seresta<sup>®</sup>)</b> Disturbi del sonno, stati di ansia		■	■		■				■					■	■
<b>Pipamperone (Dipiperon<sup>®</sup>)<sup>3</sup></b> Psicosi croniche		■	■		■	■			■			■	■		■
<b>Quetiapina (Seroquel<sup>®</sup>)<sup>3</sup></b> Schizofrenia, disturbo bipolare			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Risperidone (Risperdal<sup>®</sup>)<sup>3</sup></b> Schizofrenia, sintomi psicotici	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Zolpidem (Stilnox<sup>®</sup>)<sup>3</sup></b> Disturbi del sonno	■	■					■							■	■

■ RAF<sup>2</sup> frequenti o molto frequenti secondo l'informazione sul medicamento di Swissmedic.  
 Nota: la mancanza del visto non significa che non possano verificarsi RAF.\*

● FPI<sup>1</sup>

**RAF<sup>2</sup>**

Agitazione/confusione  
 Ansia/depressione  
 Caduta/disturbo della deambulazione  
 Cambiamenti valori di laboratorio  
 Cambiamento di appetito/peso  
 Debolezza/mancanza di forze  
 Diarrea/costipazione/fiatalenza  
 Disturbi alle vie respiratorie  
 Disturbi cardiovascolari  
 Disturbi del sonno  
 Disturbi motori  
 Dolori (p. es. mal di testa)  
 Edemi  
 Emorragie  
 Nausea/vomito  
 Prurito/eruzione cutanea  
 Secchezza della bocca  
 Sintomi psicotici (p. es. delirio)  
 Sonnolenza/stanchezza  
 Urgenza di minzione/iscuria/incontin.

- Farmacoterapie potenzialmente inadeguate
  - Reazioni avverse ed indesiderate a farmaci
  - Possono manifestarsi altre RAF frequenti o molto frequenti specifiche per il farmaco in questione. Sono state considerate primariamente le RAF con un'elevata rilevanza per il personale infermieristico.\*
  - Possono manifestarsi altre RAF, la cui frequenza non è stimabile.\*
- \* Si prega di consultare le informazioni professionali per maggiori ragguagli.



patientensicherheit schweiz  
sécurité des patients suisse  
sicurezza dei pazienti svizzera

## Principio attivo (esempio di preparato) e indicazione principale

RAF<sup>2</sup>

Agitazione/confusione  
Ansia/depressione  
Caduta/disturbo della deambulazione  
Cambiamenti valori di laboratorio  
Cambiamento di appetito/peso  
Debolezza/mancanza di forze  
Diarrea/costipazione/flatulenza  
Disturbi alle vie respiratorie  
Disturbi cardiovascolari  
Disturbi del sonno  
Disturbi motori  
Dolori (p. es. mal di testa)  
Edemi  
Emorragie  
Nausea/vomito  
Prurito/eruzione cutanea  
Secchezza della bocca  
Sintomi psicotici (p. es. delirio)  
Somnolenza/stanchezza  
Urgenza di minzione/iscuria/incontin.  
Vertigini

### Metabolismo

Macrogol (Movicol®)<sup>4</sup>

Costipazione

Metoclopramide (Primperan®)

Nausea

Pantoprazolo (Pantozol®)<sup>3/4</sup>

Reflusso gastrico, profilassi dell'ulcera

Paraffina (Paragol N®)

Costipazione

Vitamina D (Vi-De 3®)<sup>4</sup>

Carenza, osteomalacia

Vit. D + calcio (Calcimagon D3®)

Carenza, osteoporosi

### Altri gruppi

Acido acetilsalicilico (Aspirine®)

Dolori, profilassi della trombosi

Belladonna (Escotussin®)

Tosse

Estriolo (Ovestin®, Blissel®)<sup>4</sup>

Deficit estrogenico

Nitrofurantoina (Uvamin®)

Infezioni delle vie urinarie

Torasemide (Torem®)<sup>3</sup>

Iperensione, insufficienza cardiaca

Lacrime artificiali (Lacrycon®)

Occhi secchi

Urea (Excipial U®)

Cura della pelle

■ RAF<sup>2</sup> frequenti o molto frequenti secondo l'informazione sul medicamento di Swissmedic.

Nota: la mancanza del visto non significa che non possano verificarsi RAF.\*

● FPI<sup>1</sup>

1 Farmacoterapie potenzialmente inadeguate 2 Reazioni avverse ed indesiderate a farmaci

3 Possono manifestarsi altre RAF frequenti o molto frequenti specifiche per il farmaco in questione. Sono state considerate primariamente le RAF con un'elevata rilevanza per il personale infermieristico.\*

4 Possono manifestarsi altre RAF, la cui frequenza non è stimabile.\*

\* Si prega di consultare le informazioni professionali per maggiori ragguagli.

Esclusione di responsabilità: i contenuti rappresentati sono esclusivamente a scopo informativo e formativo. Tutti i contenuti sono stati accuratamente verificati. Sicurezza dei pazienti Svizzera non assume alcuna responsabilità per l'attualità, la completezza e la correttezza dei contenuti.