

UAW-TOOL

Die häufigsten Wirkstoffe und PIM¹ und deren häufigste UAW² bei Pflegeheimbewohner/innen über 65 Jahre

Wirkstoff (Beispielpräparat) und Hauptindikation

UAW²

Agitation/ Verwirrung
 Angst/ Depression
 Appetit-/ Gewichtsveränderung
 Atemwegsbeschwerden
 Bewegungsstörungen
 Blutungen
 Diarrhoe/ Obstipation/ Flatulenz
 Übelkeit/ Erbrechen
 Harndrang/ -verhalt/ Inkontinenz
 Herz- Kreislaufbeschwerden
 Juckreiz/ Hautausschlag
 Laborveränderungen
 Mundtrockenheit
 Ödeme
 Psychotische Symptome (z. B. Wahn)
 Schläfrigkeit/ Müdigkeit/ Somnolenz
 Schlafstörungen
 Schmerzen (z. B. Kopfschmerzen)
 Schwäche/ Kraftlosigkeit
 Schwindel
 Sturz/ Gangstörung

Nervensystem	Agitation/ Verwirrung	Angst/ Depression	Appetit-/ Gewichtsveränderung	Atemwegsbeschwerden	Bewegungsstörungen	Blutungen	Diarrhoe/ Obstipation/ Flatulenz	Übelkeit/ Erbrechen	Harndrang/ -verhalt/ Inkontinenz	Herz- Kreislaufbeschwerden	Juckreiz/ Hautausschlag	Laborveränderungen	Mundtrockenheit	Ödeme	Psychotische Symptome (z. B. Wahn)	Schläfrigkeit/ Müdigkeit/ Somnolenz	Schlafstörungen	Schmerzen (z. B. Kopfschmerzen)	Schwäche/ Kraftlosigkeit	Schwindel	Sturz/ Gangstörung	
Diclofenac (Voltaren®) Schmerzen			■				■	■	■	■			■			■		■			■	
Fentanyl (Durogesic®)³ Schmerzen	■	■	■	■			■	■	■	■			■		■	■	■	■			■	
Ibuprofen (Brufen®) Schmerzen, Fieber					■		■	■			■					■		■			■	
Metamizol (Novalgin®)⁴ Schmerzen, Fieber											■						■				■	
Paracetamol (Dafalgan®) Schmerzen, Fieber																						
Psychopharmaka/Sedativa																						
Haloperidol (Haldol®)³ Schizophr., schizoaffektive Störungen	■	■	■		■		■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■		■
Hydroxyzin (Atarax®)⁴ Angstzustände, Pruritus													■				■		■			
Lorazepam (Temesta®)⁴ Schlafstörungen, Angstzustände	■	■			■												■				■	
Oxazepam (Seresta®) Schlafstörungen, Angstzustände		■			■										■	■				■	■	■
Pipamperon (Dipiperon®)³ Chronische Psychosen		■			■		■	■	■	■						■			■		■	■
Quetiapin (Seroquel®)³ Schizophrenie, bipolare Störung			■	■			■	■	■	■	■					■			■		■	■
Risperidon (Risperdal®)³ Schizophrenie, psychotische Symptome	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Zolpidem (Stilnox®)³ Schlafstörungen	■	■					■								■	■	■	■			■	

■ **Sehr häufige/häufige UAW²** gemäss Arzneimittelinformationen von Swissmedic.
 ■ **Hinweis:** keine Markierung bedeutet nicht, dass gar keine UAW auftreten können.*

- 1 Potenziell inadäquate Medikation 2 Unerwünschte Arzneimittelwirkung
 3 Es können weitere sehr häufige/häufige UAW auftreten, die spezifisch sind für dieses Medikament. Es wurden primär UAW mit hoher Relevanz für das Pflegepersonal berücksichtigt.*
 4 Es können weitere UAW auftreten, deren Häufigkeit nicht abschätzbar ist.*
 * Bitte konsultieren Sie die Fachinformationen für vollständige Angaben.

Quellen UAW: Gemäss gültiger Fachinformationen ohne Präparates, ohne UAW spezifischer Applikationsarten, Stand 12.3.2020. Wirkstoffe: Die 15 häufigsten Wirkstoffe und 15 häufigsten PIM, die 2016 in Pflegeheimen bezogen wurden (Überschnedungen vorhanden), Schneide et al. Swiss Med Wkly, 2019;149:w20126.



patientensicherheit schweiz
sécurité des patients suisse
sicurezza dei pazienti svizzera

UAW²

Agitation/Verwirrung
Angst/Depression
Appetit-/Gewichtsveränderung
Atemwegsbeschwerden
Bewegungsstörungen
Blutungen
Diarrhoe/Obstipation/Flatulenz
Übelkeit/Erbrechen
Harndrang/-verhalt/Inkontinenz
Herz-Kreislaufbeschwerden
Juckreiz/Hautausschlag
Laborveränderungen
Mundtrockenheit
Ödeme
Psychotische Symptome (z. B. Wahn)
Schläfrigkeit/ Müdigkeit/Sommolenz
Schlafstörungen
Schmerzen (z. B. Kopfschmerzen)
Schwäche/Kraftlosigkeit
Schwindel
Sturz/Gangstörung

Wirkstoff (Beispielpräparat) und Hauptindikation

Stoffwechsel																				
Macrogol (Movicol®)⁴ Obstipation																				
Metoclopramid (Primperan®) Übelkeit		■			■		■			■							■			■
Pantoprazol (Pantozol®)^{3/4} Reflux, Ulkusprophylaxe																				
Paraffin (Paragol N®) Obstipation										■										
Vitamin D (Vi-De 3®)⁴ Mangel, Osteomalazie																				
Vit D + Calcium (Calcimagon D3®) Mangel, Osteomalazie																				
Weitere Gruppen																				
Acetylsalicylsäure (Aspirin®) Schmerzen, Thromboseprophylaxe										■				■						
Belladonna-Tinktur (Escotussin®) Husten														■		■				
Estriol (Ovestin®, Blissel®)⁴ Östrogenmangel																				■
Nitrofurantoin (Uvamin®) Harnwegsinfektionen																				■
Torasemid (Torem®)³ Hypertonie, Herzinsuffizienz																				■
Tränenersatz (Lacrycon®) Trockene Augen																				■
Urea (Excipial U®) Hautpflege																				■

■ **Sehr häufige/häufige** UAW² gemäss Arzneimittelinformationen von Swissmedic.
Hinweis: keine Markierung bedeutet nicht, dass gar keine UAW auftreten können.*

- 1 Potenziell inadäquate Medikation 2 Unerwünschte Arzneimittelwirkung
3 Es können weitere sehr häufige/häufige UAW auftreten, die spezifisch sind für dieses Medikament. Es wurden primär UAW mit hoher Relevanz für das Pflegepersonal berücksichtigt.*
4 Es können weitere UAW auftreten, deren Häufigkeit nicht abschätzbar ist.*
* Bitte konsultieren Sie die Fachinformationen für vollständige Angaben.